

Bijsluiter: VLO KILL+ 57 mg Nitenpyram, tabletten voor grote honden

Indicaties: De behandeling van vlooiënbesmettingen (*C. felis*) bij honden.

Toedieningswijze/dosering: Eén Vlo Kill+ 57 mg tablet dient te worden toegediend aan honden met een gewicht van 11,1 tot 57 kg wanneer een vlooiënbesmetting is aangetoond. De behandelingsfrequentie hangt af van de mate van vlooiënbesmetting. In geval van een ernstige vlooiënbesmetting kan het noodzakelijk zijn de dieren elke of om de dag te behandelen totdat de vlooiënbesmetting onder controle is. De behandeling kan worden hervat wanneer de vlooiën terugkeren. Per dag moet niet meer dan 1 behandeling worden gegeven.

Vlo Kill+ heeft geen persisterende werkzaamheid. Om herinfectie te voorkomen wordt een geschikte behandeling om de onvolwassen stadia van de vlooi levenscyclus te bestrijden aanbevolen. Aanwijzingen voor een juiste toediening: Vlooiën kunnen worden gevonden door de vacht van het dier te scheiden zodat de huid kan worden bekeken, of door het kammen van de vacht met een fijne metalen kam. Regelmatig krabben of een overmatige vachtverzorging kan ook een teken zijn van een vlooiënbesmetting.

De tabletten dienen oraal te worden toegediend, met of zonder voedsel. Om de consumptie van de tabletten te verbeteren kunnen de tabletten vlak voor de toediening worden verstoppt in een kleine hoeveelheid voer.

Overige informatie: De effecten op de vlooiën (*Ctenocephalides felis*) kunnen worden waargenomen vanaf 15-30 minuten na toediening van het product aan de gastheer. Binnen de eerste 6 uur na toediening wordt een werkzaamheid van 95-100% waargenomen en 100% werkzaamheid wordt bereikt binnen 24 uur zonder residuele activiteit. Nitenpyram wordt door honden en katten zeer goed verdragen. Overdoseringen tot 50 mg/kg bij de kat en tot 70 mg/kg bij de hond verliepen zonder symptomen.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Bijwerkingen: Gedurende het eerste uur na toediening kan het huisdier wat meer dan normaal krabben. Dit effect is het gevolg van vlooiën die op het product reageren. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Wachttermijn: Niet van toepassing

Speciale waarschuwingen: Nitenpyram kan worden toegediend gedurende dracht en lactatie. Niet toedienen aan honden die minder dan 11 kg wegen, deze groep dieren werd niet bestudeerd.

Veiligheids- en bewaringsaanbevelingen: Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeldt op de blister na EXP. Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Overtollige geneesmiddelen als klein chemisch afval verwijderen. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

Inhoud: 6 tabletten

Werkzame stof: Nitenpyram 57 mg/tablet

Registratienummer: REG NL 9989

Laatste herzieningsdatum van de bijsluiter: 12 maart 2008

Kanalisatie: vrij

VLO KILL+ 11,4 mg Nitenpyram, tabletten voor katten en kleine honden

Indicaties: De behandeling van vlooiënbesmettingen (*C. felis*) bij katten en honden.

Toedieningswijze/dosering: Eén Vlo Kill+ 11,4 mg tablet dient te worden toegediend aan katten en kleine honden met een gewicht van 1-11 kg wanneer een vlooiënbesmetting is aangetoond. De behandelingsfrequentie hangt af van de mate van vlooiënbesmetting. In geval van een ernstige vlooiënbesmetting, kan het noodzakelijk zijn de dieren elke of om de dag te behandelen totdat de vlooiënbesmetting onder controle is. De behandeling kan worden hervat wanneer de vlooiën terugkeren. Per dag moet niet meer dan één behandeling worden gegeven.

Vlo Kill+ heeft geen persisterende werkzaamheid. Om herinfectie te voorkomen wordt een geschikte behandeling om de onvolwassen stadia van de vlooi levenscyclus te bestrijden aanbevolen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening: Vlooiën kunnen worden gevonden door de vacht van het dier te scheiden zodat de huid kan worden bekeken, of door het kammen van de vacht met een fijne metalen kam. Regelmatig krabben of een overmatige vachtverzorging kan ook een teken zijn van een vlooiënbesmetting. De tabletten dienen oraal te worden toegediend, met of zonder voedsel. Om de consumptie van de tabletten te verbeteren kunnen de tabletten vlak voor de toediening worden verstoep in een kleine hoeveelheid voer.

Overige informatie: De effecten op de vlooiën (*Ctenocephalides felis*) kunnen worden waargenomen vanaf 15-30 minuten na toediening van het product aan de gastheer. Binnen de eerste 6 uur na toediening wordt een werkzaamheid van 95-100% waargenomen en 100% werkzaamheid wordt bereikt binnen 24 uur zonder residuele activiteit. Nitenpyram wordt door honden en katten zeer goed verdragen. Overdoseringen tot 50 mg/kg bij de kat en tot 70 mg/kg bij de hond verliepen zonder symptomen.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Bijwerkingen: Gedurende het eerste uur na toediening kan het huisdier wat meer dan normaal krabben. Dit effect is het gevolg van vlooiën die op het product reageren. In zeldzame gevallen kan dit zich bij katten uiten met voorbijgaande symptomen van hyperactiviteit. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Wachttermijn: Niet van toepassing

Speciale waarschuwingen: Nitenpyram kan worden toegediend gedurende dracht en lactatie. Niet toedienen aan dieren die jonger zijn dan 4 weken, of die minder wegen dan 1 kg, deze groepen van dieren werden niet bestudeerd.

Veiligheids- en bewaringsaanbevelingen: Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeldt op de blister na EXP. Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Overtollige geneesmiddelen als klein chemisch afval verwijderen. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

Inhoud: 6 tabletten

Werkzame stof: Nitenpyram 11,4 mg/tablet

Registratienummer: REG NL 9988

Laatste herzieningsdatum van de bijsluiting: 10 maart 2008

Kanalisatie: vrij