

BEILAGE

Pulvex Spot 65 % Spot-on Lösung für Hunde

1. Name und Adresse des Zulassungsinhabers und des Herstellers, falls abweichend

Zulassungsinhaber:

Intervet Nederland B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN BOXMEER

Korrespondenzadresse:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB BOXMEER

Verantwortlicher Hersteller:

Schering-Plough Animal Health
Breakspear Road South Uxbridge,
Harefield
Middlesex, UB9 6LS
England

2. Name des Tierarzneimittels

Pulvex Spot
65 % Spot-on Lösung für Hunde

3. ,Aktiv Inhalte und anderen Zutaten

Wirkstoff:

Permethrin (Cis: Trans 40: 60) 65,0 % w/w

4. Indikationen

Zur Bekämpfung und Prävention von Flohinfektionen (*Ctenocephalides felis* en *Ctenocephalides canis*).
Zur Bekämpfung und Prävention von Zeckeninfektionen (*Ixodes ricinus* en *Rhipicephalus sanguineus*).
Das Produkt kann auch in ein Behandlungsschema gegen Flohallergie-Dermatitis (FAD) aufgenommen werden.

Eine einzelne Behandlung tötet Flöhe und Zecken und schützt gegen eine Neuansteckung durch Flöhe und Zecken von zwei bis vier Wochen nach der Behandlung.

5. Gegenanzeigen

Nicht bei Welpen unter 2 Wochen anwenden.
Nicht bei Katzen anwenden.

6. Nebenwirkungen

Lokale Reizungen können an den Stellen auftreten, an denen das Mittel aufgetragen wurde. In diesem Fall den Hund mit einem Shampoo waschen und sofort einen Tierarzt aufsuchen.

- Überempfindlichkeit
- Muskelzittern
- unsicherer Gang
- Erbrechen
- Krämpfe
- intermittierende Zuckungen

Sollten Sie ernsthafte Nebenwirkungen oder andere Reaktionen beobachtet, die hier nicht aufgelistet sind, dann setzen Sie bitte Ihren Tierarzt darüber in Kenntnis.

7. Tierarten für die das Tierarzneimittel bestimmt ist

Hund

8. Dosierung für jede Zieltierart, Anwendung und Dosierung

- Hunde < 15 kg: 1 ml (1 Ampulle)
- Hunde zwischen 15 kg und 29 kg: 2 ml (2 Ampullen)
- Hunde > 30 kg: 3 ml (3 Ampullen)

Körpergewicht des Hundes (kg)	Menge	Anwendungsort	Permethrin (mg/kg Körpergewicht)
< 15 kg	1 ml	1 ml (1 Ampulle) zwischen den Schulterblättern	Zwischen 292 mg/kg Körpergewicht und 73 mg/kg Körpergewicht bei Hunden von 2,5 bis 10 kg
15 – 29 kg	2 ml	1 ml (1 Ampulle) zwischen den Schulterblättern und 1 ml (1 Ampulle) an der Schwanzwurzel.	Zwischen 97 mg/kg Körpergewicht und 58 mg/kg Körpergewicht bei Hunden von 15 bis 25 kg
> 30 kg	3 ml	1 ml (1 Ampulle) zwischen den Schulterblättern, 1 ml (1 Ampulle) auf die Schwanzwurzel und 1 ml (1 Ampulle) entlang des Rückens.	Anfänglich mit 73 mg/kg Körpergewicht bei Hunden ab 30 kg und abnehmend entsprechend der Zunahme des Gewichtes.

Tragen Sie das Mittel direkt auf die Haut auf.

Nach dem Schwimmen oder Waschen kann eine wiederholte Behandlung den Schutz erweitern. Zwischen 2 Behandlungen sollte ein Zeitraum von mindestens 7 Tagen eingehalten werden.

9. Ruhezeit

keine

10. Sicherheitsmaßnahmen für die Lagerung

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Unter 25 °C lagern. Nicht kühlen oder Einfrieren. Vor Licht schützen.

11. Spezielle Hinweise

Spezielle Hinweise bei Hunden

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dennoch vereinzelt Zecken festsaugen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei anderen Tieren

Giftig für Fische. Nicht in der Nähe von Aquarien oder offenen Gewässern (Oberflächenwasser) anwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

- Kontakt mit der Haut, den Fingern und den Augen vermeiden.
- Nach der Verwendung, Hände waschen.
- Versehentliche Flecken sofort auswaschen.

- Verhindern Sie 3 - 6 Stunden den Kontakt mit der Stelle, an der das Mittel aufgetragen wurde. Deshalb empfiehlt sich eine Verabreichung am Abend. Frisch behandelte Tiere nicht im eigenen Bett schlafen lassen, erst recht nicht bei Kindern.
- Personen, die das Produkt regelmäßig verabreichen, sollten passende Handschuhe tragen. Vorzugsweise aus Neopren oder Nitril mit einer Mindeststärke von 3 mm.

Verwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit

Teratologische Studien bei Versuchstieren , zeigten , dass sowohl Permethrin als auch Dowanol keine teratoge Risiken aufweisen. Die sichere Verwendung des Produktes während der Schwangerschaft oder Stillzeit wurde beim Hund nicht getestet.

Sollte eine Anwendung bei schwangeren Hündinnen vorgenommen werden, sollte diese einige Zeit vor der Geburt der Welpen geschehen, damit die Welpen mit dem Produkt nicht in direkten Kontakt kommen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Nicht gleichzeitig mit anderen Insektiziden wie Pyrethroide, Organophosphor-Verbindungen oder Carbamaten verwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)

Hunde, die einer mit vier Mal höheren Dosis als der empfohlenen behandelt wurden, zeigten keine Nebenwirkungen.

Inkompatibilitäten

Nicht mit anderen Tierarzneimitteln mischen.

12. Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für das Entsorgen ungenutzter Tierarzneimittel oder Reste

Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser oder im Haushalt-Abfall entsorgt werden. Nicht verwendete Tierarzneimittel oder Reste davon müssen entsprechend den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

13. Datum an dem die Packungsbeilage das letzte Mal aktualisiert wurde

22. Februar 2010

14. Anderen Informationen

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen über dieses Tierarzneimittel an den örtlichen Vertreter oder den Inhaber der Lizenz.

REG NL 09251

